

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ (Tolvaptan)

ਫਾਰਮੇਸੀ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ Pharmacy Information Sheet



ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਏ.ਡੀ.ਪੀ.ਕੇ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ:

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਇੱਕ ਵਾਸੋਪ੍ਰੇਸਿਨ ਨਾਮਕ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਸੋਪ੍ਰੇਸਿਨ ਹਾਰਮੋਨ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਪੀ.ਕੇ.ਡੀ. ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਸਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਾਸੋਪ੍ਰੇਸਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਸਿਸਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ:

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਦੀਆਂ ਦਿਨ ਵਿਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ- ਵੱਡੀ ਸੁਭਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਭਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪਿਆਸ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰਲ ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਕ) ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਵੋ। ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ।

ਸੰਭਵ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਨਾਲ ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀਂ ਪਿਆਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਖੂਨ ਵਿਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਧਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਆਮ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੂਨ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਠੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿਚ ਦਰਦ (ਅਕਸਰ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਵਿਚ) ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲੀ, ਸੋਜਸ਼ ਜਾਂ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ।



ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੂੜ੍ਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਲੈਣੀ ਇੱਕ ਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ:

ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਮਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੇਪਫਰੂਟ (ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੇ ਫਲ) ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ:

ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰ ਵਾਰ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੋਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ:

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮੋਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਭਰ ਦੇਵੇ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੀ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਤ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੋਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫਰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੂਨ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਥਾਈ ਥੌਰ ਤੇ ਟੋਲਵਾਪਟਾਨ ਬੰਦ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੋਟ ਹੇਠਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੋ:
